



Quel diagnostic ?



Diagnostic des infestations et leur pertinence

	Coproscopies						dosage pepsinogène	Sérologie
	strongles digestifs	strongles pulmonaires	grande douve	paramphistome	coccidies	petite douve	strongles digestifs	grande douve
Présence d'infestation	OUI	OUI si méthode BAERMANN	OUI (1)	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Niveau d'infestation	NON	NON	NON	OUI sur veaux	NON	NON	OUI sur veaux et génisses	NON
Décision	NON	OUI si signes cliniques	OUI	OUI	NON	NON	OUI si veaux et génisses	OUI

d'après parasites des bovins mieux les connaître pour mieux les gérer dans les exploitations du bassin Charolais.

La coproscopie est préconisée pour le diagnostic des paramphistomes et la sérologie pour le diagnostic de la Grande Douve.

La coproscopie n'est pas un indicateur du niveau d'infestation sauf pour les paramphistomes chez les broutards.

Absence d'oeuf de grande douve dans la coproscopie n'indique pas l'absence de parasites chez le bovin

le dosage de pepsinogène pour les strongles digestifs permet de préciser le niveau d'infestation dans la caillette et donc de prévoir le traitement ou pas.

Conclusion

La présence de parasites ne signifie pas toujours présence de la maladie et traitement.